Lampropeltis californiae

Culebra real de California, serpiente rey

Catálogo invasoras

Clasificación científica

Metazoa - Chordata - Reptilia - Squamata - Colubridae

Clasificación divulgativa

animales - reptiles

Descripción técnica

Se trata de un colúbrido elegante de cabeza estrecha y hocico redondeado. Ojos bien desarrollados con pupilas circulares. Dorso recubierto de escamas dorsales alargadas, lisas, brillantes y solapadas, que se disponen en 23, 24 o 25 series longitudinales en la zona media del cuerpo las escamas ventrales se disponen en una única serie longitudinal, y en un número comprendido entre 213 y 255. Presenta una placa anal simple, y en la cola disponen de 46 a 63 pares de escamas subcaudales en los machos, y entre 44 y 57 en las hembras (Blaney, 1977; Gallo y Mateo, 2020). No posee dientes inoculadores de veneno (Gallo y Mateo, 2020).

Lampropeltis californiae es un ofidio de tamaño medio. En el área nativa de la especie el tamaño de las culebras reales de California se encuentra en un rango entre los 230 mm de longitud total (LT) de los recién nacidos y los dos metros que alcanzan algunos individuos de la población insular de Ángel de la Guarda, una isla localizada en el mar de Cortés. La inmensa mayoría de los ejemplares de las poblaciones continentales y los que se capturan en la isla de Gran Canaria raramente superan los 1600 mm LT. El tamaño medio de las culebras reales capturadas en Gran Canaria es de 911 mm LT, 809 mm de longitud hocico-cloaca, y 222,4 g de peso (Gallo y Mateo, 2020).

Existe una gran variedad de diseños con utilización de colores los oscuros y pardos con colores más claros como el blanco, amarillo y beige. También es frecuente que los diferentes patrones se den con albinismo. El diseño dorsal más común es el que presenta bandas longitudinales dorsolaterales claras que se superponen sobre un fondo pardo, pardo oscuro o negro (diseño rayado). El segundo diseño predominante es el diseño anillado, en el que sobre una coloración oscura (parda o negra) se superponen entre 21 y 44 bandas transversales de color más claro (blancas, amarillas, amarillentas o beige) entre el borde posterior del píleo y la zona de la cloaca . La anchura de los anillos claros también varía de un individuo a otro (Blaney, 1977; Gallo y Mateo, 2020).

Fuente: EXOS
Más info (https://www.biodiversidadcanarias.es/exos/especie/V00234)

Galería

4 fotos



Ramón Gallo Barneto



Ramón Gallo Barneto





Reportes

Últimos 15 reportes validados

FECHA	USUARIO	UBICACIÓN	ISLA
18/08/2025	JonayTacoronte	Las Palmas de Gran Canaria	Gran Canaria
09/05/2025	nestortheonlyic	Gáldar	Gran Canaria
16/04/2025	tgilbert974	Gáldar	Gran Canaria
08/07/2024	Xabier	Gáldar	Gran Canaria
17/06/2024	Guillermo Garcia Garcia	Agaete	Gran Canaria
28/04/2024	Dey	Telde	Gran Canaria
16/04/2025	Fataga2	San Bartolomé de Tirajana	Gran Canaria
30/04/2024	Carlos Cáceres	Telde	Gran Canaria
28/06/2023	Cdelmat	Las Palmas de Gran Canaria	Gran Canaria
05/04/2023	Argentina Oliva	Valsequillo de Gran Canaria	Gran Canaria
23/03/2023	EQUIPO REDEXOS GC	Gáldar	Gran Canaria
17/05/2021	Canarina	Agaete	Gran Canaria
26/10/2023	EQUIPO REDEXOS FV	Puerto del Rosario	Fuerteventura
09/07/2021	EQUIPO REDEXOS GC	Pájara	Fuerteventura
17/06/2019	Manteca2	San Bartolomé de Tirajana	Gran Canaria