Virgotyphlops braminus

Culebrilla ciega de las macetas, Flowerpot Snake

Potencialmente invasora

Clasificación científica

Metazoa - Chordata - Reptilia - Squamata - Typhlopidae

Clasificación divulgativa

animales - reptiles

Descripción técnica

La culebrilla de las macetas es un pequeño ofidio perteneciente a la familia Typhlopidae, de aspecto vermiforme y cabeza roma poco diferenciada de la cola. Los adultos raramente superan los 175 mm de longitud total y su cuerpo es estilizado (5 mm de sección máxima) y no segmentado. La cabeza presenta una placa rostral bien definida, acompañada por dos prefrontales. Tienen pequeños ojos vestigiales dispuestos bajo sendas placas, dotados de retinas rudimentarias con pocos bastones que les permiten distinguir luz de oscuridad. El cráneo es acinético y los dentarios se encuentran unidos, por lo que las presas que pueden ingerir no pueden ser de mayor tamaño que su propia sección corporal. Presentan dientes en los maxilares, pero nunca en los palatinos, en los pterigoides o los dentarios. La cabeza dispone de numerosas glándulas situadas en el borde de las placas cefálicas y a las que se ha supuesto una función lubricante y de protección del cuerpo frente a las abrasiones que podrían provocarle su modo de vida excavador. El cuerpo está recubierto de escamas lisas dispuestas en 20 series longitudinales alrededor del cuerpo, sin que presenten grandes diferencias de forma o tamaño entre el dorso y el vientre. Entre la cabeza y la cloaca presenta entre 306 y 348 series de escamas ventrales, mientras que en la cola se han contado entre 43-52 series de ventrales. Tienen siempre más de 500 vértebras y restos de cintura pelviana. La cola es corta (menos del 3% de la longitud total del cuerpo) y terminada en un espolón puntiagudo. Su carácter partenogenético hace que la especie sea muy conservadora en su folidosis . Posee un solo pulmón y el hígado es multilobulado. Adultos y juveniles suelen presentar una coloración parda, que puede variar mucho en su tonalidad. La coloración ventral suele ser algo más clara que el dorso. Algunos ejemplares pueden presentar tonos azulados durante la muda. Pueden confundirse con facilidad con otras especies de Scolecophidia (familias Typhlopidae y Leptotyphlopidae), con anfisbénidos o incluso con lombrices de tierra (Ota et al., 1991; Kley, 2002; Urioste y Mateo 2010; Mateo, 2013; Wallach, 2020a).

Fuente: EXOS


Más info (https://www.biodiversidadcanarias.es/exos/especie/V00224)

Galería

5 fotos











Reportes

Últimos 20 reportes validados

FECHA	USUARIO	UBICACIÓN	ISLA
16/09/2026	hectorhgd	Candelaria	Tenerife
14/09/2026	Equipo REDEXOS TF	Guía de Isora	Tenerife
16/09/2026	rmonclus	Santa Cruz de Tenerife	Tenerife
12/08/2026	TAP REDEXOS	Telde	Gran Canaria
07/08/2026	EQUIPO REDEXOS GC	Telde	Gran Canaria
27/07/2026	EQUIPO REDEXOS GC	Mogán	Gran Canaria
16/07/2026	Aviso ciudadano	San Bartolomé de Tirajana	Gran Canaria
03/12/2025	Gabi	San Bartolomé de Tirajana	Gran Canaria
25/11/2025	Aviso ciudadano	Las Palmas de Gran Canaria	Gran Canaria
11/11/2025	EQUIPO REDEXOS LZ	Teguise	Lanzarote
04/11/2025	TAP REDEXOS TF	Santa Cruz de Tenerife	Tenerife
02/11/2025	Beatriz Fariña	Tazacorte	La Palma
28/10/2025	Aviso ciudadano	San Cristóbal de La Laguna	Tenerife
27/10/2025	TAP REDEXOS TF	Candelaria	Tenerife
15/10/2025	Shiasheila	Las Palmas de Gran Canaria	Gran Canaria
17/10/2025	Aviso ciudadano	Icod de los Vinos	Tenerife
15/09/2025	EQUIPO REDEXOS GC	Las Palmas de Gran Canaria	Gran Canaria
11/04/2025	Equipo REDEXOS TF	Adeje	Tenerife
19/11/2024	EQUIPO REDEXOS GC	San Bartolomé de Tirajana	Gran Canaria
12/11/2024	Equipo REDEXOS TF	Puerto de la Cruz	Tenerife